

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



ハイシー®細粒

ビタミンC剤

指定医薬部外品

特徴

- ビタミンC 1,000mgを1包で補給できます。
- ビタミンB₂も配合しています。
- 疲れたときやカゼをひいたときなどのビタミンC補給に効果的です。
- サツと溶ける、甘ずっぱい黄色の細粒です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること

次の診断を受けた人。
フェニルケトン尿症

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること

下痢

効 能

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時または中高年期のビタミンCの補給

用法・用量

次の量を、水またはお湯で服用すること。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	1回
15歳未満	服用しないこと	



<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を守ること。(他のビタミン等を含む製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)

(裏面へ続く)

成分 1包(2g)中

成分	含量
ビタミンCとして	1,000mg
〔アスコルビン酸(ビタミンC) L-アスコルビン酸ナトリウム〕	500mg 562.395mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	6mg


添加物：トウモロコシデンプン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、白糖

<成分に関連する注意>

- (1)尿および大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師に知らせること(尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがある)。
- (2)本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン酪酸エステルによるものなので心配ありません。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。
武田コンシューマーヘルスケア株式会社「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-567-087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

なお、タケダ健康サイトでは、多くの健康情報や症状・疾患の情報をわかりやすく紹介しています。

[タケダ健康サイト](http://takeda-kenko.jp) **検索** <http://takeda-kenko.jp>

製品のご注文、お届けやサービスに関するお問い合わせは
通話料無料 0120-866-333
受付時間：9：00～23：00（年末・年始を除く）
タケダ通販ショップHP <http://shop.takeda.co.jp/>

製造販売元  **武田コンシューマーヘルスケア株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号